

CARACOLES TERRESTRES DE ANDALUCÍA (GASTROPODA, STYLOMMATOPHORA)

Escrito por: José Ramón Arrébola Burgos. Colaboran: Félix Río Jiménez

Presentamos la lista de los caracoles que se dan en Andalucía. Como otras listas que ya hemos publicado en esta web, queda abierta a la colaboración de los socios. Podrán aportar correcciones y nuevas citas si fuese el caso. Así con las actualizaciones posteriores, mantendremos al día los taxones con el máximo rigor posible.

Para contactar: mastus@us.es; ríosif60@ono.com.

Familia: SPHINCTEROCHILIDAE Zilch, 1960

Sphincterochila (Albea) candidissima (Draparnaud, 1801)

Sphincterochila (Cariosula) baetica (Rössmassler, 1854)

Sphincterochila (Cariosula) cariosula hispanica (Westerlund, 1886)

Familia: TRISSEXODONTIDAE Nordsieck, 1987

Caracollina (Caracollina) lenticula (Michaud, 1831)

Gasuliella simplicula (Morelet, 1845)

Oestophora barbula (Rossmässler, 1838)

Oestophora granesae Arrébola, 1998

Oestophora tarnieri (Morelet, 1854)

Oestophora ortizi De Winter y Ripken, 1991

Oestophora calpeana (Morelet, 1854)

Oestophora dorotheae (Hesse, 1930)

Oestophora ebria (Corbellá, 2004)

Oestophora n. sp. 1

Oestophora n. sp. 2

Hatumia cobosi (Ortíz de Zárate, 1962)

Hatumia pseudogasulli Arrébola, Prieto, Puente y Ruíz, 2006

Gasullia gasulli (Ortíz de Zárate y Ortíz de Zárate, 1961)

Familia: HYGROMIIDAE Tryon, 1866

Subfamilia: Cochlicellinae Schileyko, 1972

Cochlicella (Cochlicella) acuta (O. F. Müller, 1774)

Cochlicella (Cochlicella) conoidea (Draparnaud, 1801)

Cochlicella (Prietocella) barbara (Linnaeus, 1758)

Subfamilia: Monachinae Wenz, 1930 (1904)

Monacha (Monacha) cartusiana (O. F. Müller, 1774)

Subfamilia: Geomitrinae Boettger, 1909

Xerocrassa jimenezensis (Puente y Arrébola, 1996)

Xerocrassa zaharensis (Puente y Arrébola, 1996)

Xerocrassa murcica (Guirao en Schmiidt, 1854)

Xerocrassa cobosi (Ortíz de Zárate, 1962)

Trochoidea (Trochoidea) elegans (Gmelin, 1791)

Subfamilia: Hygromiinae Tyron, 1866

Microxeromagna armillata (R. T. Lowe, 1852)

Xeroleuca vatonniana (Bourguignat, 1867)

Xerotricha conspurcata (Draparnaud, 1801)

Xerotricha apicina (Lamarck, 1822)

Xerotricha mariae (Gasull, 1972)

Helicella cistorum (Morelet, 1845)

Helicella stiparum (Rossmässler, 1854)

Helicella madritensis (Rambur, 1868)

Helicella gasulli Ortíz de Zárate, 1950

Helicella huidobroi (Azpeitia, 1925)

Helicella zujarensis (Ortiz de Zárate, 1950)

Trichia martigena (Fèrussac, 1832)

Trichia hispida (Linnaeus, 1758)

Ganula gadirana (Muñoz, Almodóvar y Arrébola, 1999)

Portugala inchoata (Morelet, 1845)

Candidula gigaxii (L. Pfeiffer, 1850)

Xerosecta (Xeromagna) cespitum (Draparnaud, 1801)

Xerosecta (Xeromagna) adolfi (Pfeiffer, 1854)

Xerosecta (Xeromagna) promissa (Westerlund, 1893)

Xerosecta (Xeromagna) reboudiana (Bourguignat, 1863)

Cernuella (Cernuella) virgata (Da Costa, 1778)

Subfamilia: Ponentininae Schileyko, 1991

Ponentia subvirescens (Bellamy, 1839)

Familia: HELICIDAE Rafinesque, 1815

Subfamilia: Helicinae Rafinesque, 1815

Cornu aspersum aspersum (O. F. Müller, 1774)

Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis (Linnaeus, 1758)

Otala (Otala) lactea lactea (O. F. Müller, 1774)

Otala (Otala) lactea murcica (Rossmässler, 1854)

Otala (Otala) punctata (O. F. Müller, 1774)
Eobania vermiculata (O. F. Müller, 1774)
Pseudotachea litturata (Pfeiffer, 1851)
Pseudotachea splendida (Draparnaud, 1801)
Theba pisana pisana (O. F. Müller, 1774)
Theba andalusica Gittenberger y Ripken, 1987
Theba pisana arietina (Rossmässler, 1846)
Theba subdentata helicella (Wood, 1828)
Iberus gualtieranus (Linnaeus, 1758)
Morfo alonensis (Helix alonensis Fèrussac, 1821)
Morfo campesinus (Helix campesina) Ezquerro en Pfeiffer, 1846)
Morfo gualtieranus (Helix gualtierana Linnaeus, 1758)
Morfo gualtieroloxanus (Iberus gualtieroloxanus García San Nicolás, 1947)
Morfo cobosi (Iberus cobosi Ibañez y Alonso, 1978)
Morfo guiraoanus (Helix guiraoana Rossmässler, 1854)
Morfo angustatus (Iberus guiraoana var. *angustata* Rossmässler, 1854)
Morfo marmoratus (Helix marmorata Fèrussac, 1821)
Morfo loxanus (Helix loxana Rossmässler, 1854)
Morfo mariae (Iberus mariae Cobos, 1979)
Morfo ornatissimus (Iberus ornatissimus Cobos, 1979)
Morfo alcarazanus (Helix alcarazana Guirao en Rossmässler, 1854)

Familia: SUBULINAE Fischer y Crosse, 1877

Subfamilia: Rumininae Wenz, 1923

Rumina decollata (Linnaeus, 1758)

Familia: FERUSSACIIDAE Bourguignat, 1883

Subfamilia: Ferussaciinae Bourguignat, 1883

Cecilioides (Cecilioides) acicula (O. F. Müller, 1774)

Cecilioides (Cecilioides) petitiana (Benoit, 1862)

Ferussacia (Ferussacia) follicula (Gmelin, 1791)

Hohenwartiana disparata (Westerlund, 1892)

Familia: AZECIDAE Watson, 1920

Hypnophila malagana Gittenberger y Menkhorst, 1983

Familia: COCHLICOPIDAE Pilsbry, 1900 (1879)

Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774)

Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1834)

Familia: CHONDRINIDAE Steenberg, 1925

Chondrina calpica calpica (Westerlund, 1872)

Chondrina granatensis Alonso, 1974

Chondrina maginensis Arrébola y Gómez, 1998

Granopupa granum (Draparnaud, 1801)

Rupestrella dupotetii (Terver, 1839)

Familia: ORCULIDAE Pilsbry, 1918

Orculella bulgarica (Hesse, 1915)

Familia: PUPILLIDAE Turton, 1831

Pupilla (Pupilla) muscorum (Linnaeus, 1758)

Pupilla (Pupilla) triplicata (S. Studer, 1820)

Familia: LAURIIDAE Steenberg, 1925

Jauria (Lauria) cylindracea (Da Costa, 1778)

Familia: PYRAMIDULIDAE Kennard y B. B. Woodward, 1914

Pyramidula rupestris (Draparnaud, 1801)

Pyramidula jaenensis (Clessin, 1882)

Pyramidula pusilla (Vallot, 1801)

Familia: VALLONIIDAE Morse, 1864

Subfamilia: Valloniinae Morse, 1864

Vallonia costata (O. F. Müller, 1774)

Vallonia excéntrica (Sterki, 1893)

Vallonia pulchella (O. f. Müller, 1774)

Subfamilia: Acanthinulinae Steenberg, 1917

Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774)

Familia: VERTIGINIDAE Fitzinger, 1833

Subfamilia: Vertigininae Fitzinger, 1833

Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801)

Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801)

Subfamilia: Truncatellinae Steenberg, 1925

Truncatellina callicatris (Scacchi, 1833)
Truncatellina cylindrica (A. Fèrussac, 1807)

Familia: ENIDAE B. B. Woodward, 1903 (1880)

Mastus pupa (Linnaeus, 1758)
Merdigera obscura (O. F. Müller, 1774)
Jaminia quadridens quadridens (O. F. Müller, 1774)

Familia: PUNCTIDAE Morse, 1864

Punctum (Punctum) pygmaeum (Draparnaud, 1801)
Paralaoma servilis (Shuttleworth, 1852)

Familia: EUCONULIDAE H. B. Baker, 1928

Euconulus (Euconulus) fulvus (O. F. Müller, 1774)

Familia OXYCHILIDAE P. Hesse, 1927 (1879)

Subfamilia: Oxychilinae P. Hesse, 1927 (1879)
Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi draparnaudi (H. Beck, 1837)
Oxychilus (Oxychilus) cellarius (O. F. Müller, 1774)
Oxychilus (Ortizius) rateranus (Servain, 1880) *sensu* Riedel, 1972)
Mediterranea hydatina (Rossmässler, 1838)

Subfamilia: Godwiniinae C. M. Cooke, 1921
Aegopinella minor (Stabile, 1864)

Familia: PRISTILOMATIDAE T. Cockerell, 1891

Vitrea (Vitrea) contracta (Westerlund, 1871)

Familia: GASTRODONTIDAE Tyron, 1866

Zonitoides (Zonitoides) nitidus (O. F. Müller, 1774)

Familia: VITRINIDAE Fitzinger, 1833

Subfamilia: Vitrininae Fitzinger, 1833
Vitrina (Vitrina) pellucida (O. F. Müller, 1774)

Subfamilia: Plutoninae T. Cockerell, 1893
Oligolimax annularis (S. Studer, 1820)

Familia: SUCCINEIDAE Beck, 1837

Oxyloma (Oxyloma) elegans elegans (Risso, 1826)

Succinea oblonga (Draparnaud, 1801)

Succinea putris (Linnaeus, 1758)